Colza d'hiver

KADORE

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal lignée	**Année d'inscription** 2004	**Pays d'inscription** Royaume-Uni	**Tolérance herbicide** non
Tolérance à la hernie des crucifères non	**Commercialisation** VRAI	**Représentant en France** KWS Momont	**Code obtenteur** -

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | Précoce | Mi-précoce | Mi-tardive | **Tardive**

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

Très précoce | Précoce | Intermédiaire | **Tardive**

PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très très précoce | Très précoce | Précoce | Mi-précoce | Mi-tardive | **Tardive**

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES

Très faible | Faible | Moyenne | **Elevée** | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

Très sensible | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

Forte | Moyenne | **Faible**

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR

Courte | Moyenne | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA

Non classée | Sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

plus de 10 ans | Entre 4 et 9 ans | moins de 4 ans

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

Quantitative | RlmS | LepR1

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

Sensible | Moyen | Bon

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-