Synthèse variétale tournesol 2026

Résultats complets

9 novembre 2026

Présentation du réseau d'évaluation 2026

En 2026, le réseau d'évaluation variétale tournesol Terres Inovia, constitué de 96 essais répartis sur le territoire était organisé autour de trois séries de précocité : très précoce, précoce et mi-précoce/mi-tardive. Au final, 65 essais sont validés et leurs données intégrées dans cette synthèse, 31 essais ont été abandonnés avant récolte, ou déclarés invalides. Les principales raisons d'invalidation des essais sont des dégâts de ravageurs, des levées hétérogènes, des peuplements trop irréguliers.
Les rendements obtenus dans les essais s'échelonnent de 12 q/ha, pour les plus petits potentiels, à 51 q/ha.

Nous remercions vivement les techniciens des organismes partenaires (AGORA, AGRIAL, AGRO CENTRE, AXEREAL, CAL/EPILOR, CDPM85, CERESIA, CETA de Laon, les chambres d'agriculture 02, 16, 36, 37, Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, Chambre d'agriculture de Normandie, CIA 17-79, EMC2, FDGEDA 18, Groupe Isidor, KWS Maïs France, LG Semences, Lidea, Limagrain coop, Mas Seeds, Neolis, Nord Négoce, Oxyane, Pioneer Semences, RAGT Semences, Soufflet Agriculture, Syngenta, Terrena, Terres du Sud, UCAL, UCATA) et les techniciens d'expérimentation de Terres Inovia qui ont implanté et conduit les essais, ainsi que l'équipe du laboratoire d'analyses Terres Inovia à Ardon pour les résultats de qualité des graines.
Nous remercions également les agriculteurs chez qui ces essais ont été réalisés.



Consultez et choisissez les meilleures variétés adaptées à vos besoins
myvar par Terres Inovia

Document réalisé par : Céline Motard - Evaluation des variétés – Terres Inovia

Sommaire

RESEAU TRES PRECOCE OLEIQUE 3

CARACTERISTIQUES DES VARIETES TRES PRECOCE OLEIQUES 4
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES TRES PRECOCES OLEIQUES 5
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 7

RESEAU PRECOCE OLEIQUE 8

CARACTERISTIQUES DES VARIETES PRECOCE OLEIQUES 10
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES PRECOCES OLEIQUES REGROUPEMENT EST 11
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 13
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES PRECOCES OLEIQUES REGROUPEMENT CENTRE OUEST 14
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 16

RESEAU PRECOCE OLEIQUE TOLERANTES HERBICIDES (VRTH) 17

CARACTERISTIQUES DES VARIETES PRECOCE OLEIQUES VRTH 19
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES PRECOCES OLEIQUES VRTH REGROUPEMENT EST 20
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 22
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES PRECOCES OLEIQUES VRTH REGROUPEMENT CENTRE OUEST 23
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 25

RESEAU MI-PRECOCE / MI-TARDIF OLEIQUE 26

CARACTERISTIQUES DES VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE OLEIQUE 27
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE OLEIQUES 28
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 30

RESEAU MI-PRECOCE / MI-TARDIF OLEIQUE TOLERANTES HERBICIDES (VRTH) 31

CARACTERISTIQUES DES VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE OLEIQUE VRTH 32
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE OLEIQUES VRTH 33
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 35

RESEAU PRECOCE LINOLEIQUE TOLERANTES HERBICIDES (VRTH) 36

CARACTERISTIQUES DES VARIETES PRECOCE LINOLEIQUES VRTH 37
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES PRECOCE LINOLEIQUES VRTH 38
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 40

RESEAU MI-PRECOCE / MI-TARDIF LINOLEIQUE 41


CARACTERISTIQUES DES VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE LINOLEIQUE 42
PRODUCTIVITE – RENDEMENT GRAINES - VARIETES MI-PRECOCE / MI-TARDIVE LINOLEIQUES 43
Indices de rendement et itinéraires techniques par essai 45

Réseau TRES PRECOCE oléique

7 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :

Regroupement national			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	15	6	9
Localisation : département (nb d'essais)	02(x2), 14, 21, 27, 51, 52(x2), 54(x2), 55, 60, 80, 85, 89	02(x2), 14, 27, 52, 54	21, 51, 52, 54, 55, 60, 80, 85, 89

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau très précoce Oléique



Contacts régionaux :

- **Aurore Baillet** – Lorraine, Alsace, Haute-Marne a.baillet@terresinovia.fr
- **Jean Lieven –** Normandie / Ile-de-France Ouest j.lieven@terresinovia.fr
- **Mathieu Dulot** – Champagne-Ardenne, Seine-et-Marne m.dulot@terresinovia.fr
- **Nicolas Latraye** – Hauts-de-France n.latraye@terresinovoa.fr
- **Thomas Mear** – Bretagne/Pays-de-la-Loire t.mear@terresinovia.fr
- **Victoire Lefèvre** – Bourgogne – Franche-Comté v.lefevre@terresinovia.fr

Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
02032	**COUCY LES EPPES (02)**	CETA LAON	Trop hétérogène en stat	I
02039	**BAZOCHES SUR VESLES (02)**	CERESIA	Trop hétérogène, trop de variétés randomisées avec des précocités différentes	I
14043	**VILLY LEZ FALAISE (14)**	CA NORMANDIE	Trop hétérogène en stat	I
21042	**BROINDON (21)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 101, 106, 107, 108, 205, 306, 307	V
27044	**MOUSSEAUX NEUVILLE (27)**	TERRES INOVIA	Trop hétérogène en densité et en stat	I
51040	**ST QUENTIN SUR COOLE (51)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 206	V
52037	**LEFFONDS (52)**	EMC2	Bcp de dégâts de gibiers en fin de cycle	I
52038	**SILVAROUVRES (52)**	SOUFFLET AGRICULTURE	Valide sans LG50268 dégâts de blaireaux	V
54034	**ROSIERES EN HAYE (54)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 107 et 210	V
54036	**GERBECOURT ET HAPLEMONT (54)**	CAL/EPILOR	Dégâts d'oiseaux à la levée	I
55035	**BEUREY SUR SAULX (55)**	NORD NEGOCE	Valide sans la colonne 4 donc les parcelles 104, 108, 204, 208, 304, 308	V
60033	**GANNES (60)**	AGORA	Valide sans les parcelles 101 et 309	V
80031	**ESTREES MONS (80)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 203, 209, 303 et 308	V
85045	**TRIAIZE (85)**	CA 85	Valide sans B4 et parcelle 207	V
89041	**ORMOY (89)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 305	V
			TOTAL validés	**9**

Caractéristiques des variétés Très Précoce Oléiques

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
TP	4A	**LG 50276HOV**	LG Semences	2022	**PS**	**TPS**	**AS**	RM8#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P
TP	T	**RGT CAPITOLL**	RAGT Semences	2020 - Italie	**PS**	**PS**	**AS/PS**	-	Moyenne	Petite	Courte	P
Début P	1A	**RGT LLISBONNE**	RAGT Semences	2025	**PS**	**PS**	**AS/PS**	RM9#	Elevée	Moyenne	Moyenne	P
TP	3A	**SY ALMAGRO**	Syngenta	2023	**S**	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	P
TP	T	**SY ARCO**	Syngenta	2017 - Espagne	**S**	**TPS**	**AS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P
Début P	4A	**SY ARPEGIO**	Syngenta	2021 - Espagne	**S**	**TPS**	**AS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Haute	P
Variété issue du catalogue européen												
Début P	VCM	**LG 50272HOV**	LG Semences	2026 - Italie	**-**	**TPS**	**AS***	RM8#(DF)	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
AS/PS	Assez sensible/ Peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible

T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
TP	Très Précoce
P	Précoce
*	Donnée à confirmer

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)


Variétés classées par groupe de précocité à maturité puis indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%)	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
SY ALMAGRO (3A)	TP	**104.7**	7.0	8/9	106.7	45.5	89.7 ±1.2	33.6	6.7	55.6	135	26-juin
RGT CAPITOLL (T)	TP	**99.1**	7.0	4/9	95.7	44.1	87.8 ±0.8	31.8	6.8	39.3	110	27-juin
SY ARCO (T)	TP	**95.7**	8.1	3/9	98.0	45.3	89.3 ±1.2	35.6	6.1	46.1	123	27-juin
LG 50276HOV (4A)	TP	**89.8**	7.2	0/9	88.1	45.5	89.9 ±0.7	32.7	7.3	49.3	115	28-juin
SY ARPEGIO (4A)	Début P	**104.0**	7.4	7/9	104.7	45.3	89.6 ±0.6	34.8	7.1	54.6	135	26-juin
RGT LLISBONNE (1A)	Début P	**101.4**	8.5	4/9	104.7	47.4	89.1 ±1.1	34.1	7.6	49.6	122	30-juin
Variété issue du catalogue européen												
LG 50272HOV (VCM)	Début P	**105.3**	4.8	7/9	102.0	44.3	89.1 ±0.8	30.1	7.2	47.9	123	28-juin
Effectif		9			**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**7**	**11**	**9**
Moyenne		**31.9 q/ha**			**1.3 t/ha**	**45.3 %**	**89.2 %**	**33.2 %**	**7.0 %**	**48.9 g**	**123 cm**	**28-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire

Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "très précoce oléique"

9 essais,
Rendement moyen de la série : 31,9q/ha



Série Très précoce oléique

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	BROINDON - 21220	ST QUENTIN SUR COOLE - 51240	SILVAROUVRES - 52120	ROSIERES EN HAYE - 54385	BEUREY SUR SAULX - 55000	GANNES - 60120	ESTREES MONS - 80200	TRIAIZE - 85580	ORMOY - 89400	Indice moyen
Organisme partenaire	TERRES INOVIA	TERRES INOVIA	SOUFFLET AGRICULTURE	TERRES INOVIA	NORD NEGOCE	AGORA	TERRES INOVIA	CA 85	TERRES INOVIA	
Code essai	21042	51040	52038	54034	55035	60033	80031	85045	89041	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription										
LG 50276HOV	94.6	93.2	83.1	93.2	95.5	97.8	75.8	84.6	90.0	89.8
RGT CAPITOLL	101.6	101.3	95.8	95.9	91.6	112.4	91.5	106.3	95.5	99.1
RGT LLISBONNE	116.0	88.8	101.4	99.7	98.8	111.2	106.4	96.0	94.3	101.4
SY ALMAGRO	102.5	103.0	108.5	112.2	109.7	88.2	103.6	105.5	108.7	104.7
SY ARCO	85.7	92.9	101.6	107.6	88.0	86.9	105.1	99.2	94.3	95.7
SY ARPEGIO	101.4	113.5	109.3	92.2	107.7	94.4	111.0	100.6	105.8	104.0
Variété issue du catalogue européen										
LG 50272HOV	98.1	107.2	100.3	99.2	108.7	109.0	106.5	107.8	111.3	105.3
Moyenne (q/ha)	**24.8**	**23.6**	**22.4**	**26.9**	**30.8**	**48.3**	**43.3**	**39.6**	**27.6**	
Informations Itinéraire Technique										
Date de semis	09 avr.	09 avr.	16 avr.	09 avr.	16 avr.	13 avr.	16 avr.	02 avr.	10 avr.	
Date de récolte	08 sept.	08 sept.	11 sept.	27 août	15 sept.	16 sept.	29 sept.	19 août	04 sept.	
Précédent	Blé tendre d'hiver	-	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé dur	Orge d'hiver	
Texture	Argilo-limoneux	Craie de champagne	-	Argilo-limoneux	Argilo-sablo-limoneux	Limon	Limono-argileux	Argile	Argilo-limoneux	
Dose d'azote (U/ha)	65	-	67	40	-	40	80	60	50,7	
Irrigation	non	non	non	non	non	non	non	non	non	

(-) données manquantes

Réseau PRECOCE oléique

10 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :


Série Précoce Oléique EST			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	12	1	11
Localisation : département (nb d'essais)	01, 02, 10, 21, 51, 52, 54(x2), 55, 63(x2), 89	54	01, 02, 10, 21, 51, 52, 54, 55, 63(x2), 89

Série Précoce Oléique CENTRE-OUEST			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	17	7	10
Localisation : département (nb d'essais)	16(x2), 17(x3), 18(x2), 28, 36, 37(x2), 41, 85(x2), 86(x3)	16(x2), 17, 18, 36, 41, 86	17(x2), 18, 28, 37(x2), 85(x2), 86(x2)

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau précoce Oléique EST



Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau précoce Oléique CENTRE-OUEST



Contacts régionaux :

- **Alexandra Denoyelle –** Auvergne – Rhône-Alpes a.denoyelle@terresinovia.fr
- **Aurore Baillet** – Lorraine, Alsace, Haute-Marne a.baillet@terresinovia.fr
- **Mathieu Dulot** – Champagne-Ardenne, Seine-et-Marne m.dulot@terresinovia.fr
- **Nicolas Latraye** – Hauts-de-France n.latraye@terresinovoa.fr
- **Victoire Lefèvre –** Bourgogne – Franche-Comté v.lefevre@terresinovia.fr

Contacts régionaux :

- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin e.tourton@terresinovia.fr
- **Jean Lieven –** Normandie / Ile-de-France Ouest j.lieven@terresinovia.fr
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire j.charbonnaud@terresinovia.fr
- **Thomas Mear** – Bretagne/Pays-de-la-Loire t.mear@terresinovia.fr

Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
01074	**VILLENEUVE (01)**	OXYANE	Valide sans restriction	V
02047	**MAUREGNY EN HAYE (02)**	CA 02	Valide sans restriction	V
10053	**VIREY SOUS BAR (10)**	SOUFFLET AGRICULTURE	Valide sans restriction	V
21055	**BROINDON (21)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 106, 107, 301, 306	V
51052	**ST QUENTIN SUR COOLE (51)**	TERRES INOVIA	Valide sans restriction	V
52051	**LEFFONDS (52)**	EMC2	Valide sans les parcelles 108, 302 et 308	V
54049	**GERBECOURT ET HAPLEMONT (54)**	CAL/EPILOR	Dégâts d'oiseaux à la levée	I
54102	**ROSIERES EN HAYE (54)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 106 et 107	V
55048	**BEUREY SUR SAULX (55)**	NORD NEGOCE	Valide sans restriction	V
63073	**VEYRE MONTON (63)**	LIMAGRAIN COOP	Valide sans les parcelles 201, 304, 306, 308 et 309	V
63075	**EFFIAT (63)**	UCAL	Valide sans restriction	V
89054	**ORMOY (89)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 302	V
TOTAL validés Regroupement EST				**11**
16065	**PALLUAUD (16)**	CA 16	Essai trop hétérogène en densité	I
16071	**COURCOME (16)**	PIONEER SEMENCES	Levée trop échelonnée, hétérogénéité de stade trop importante	I
17064	**CHAMBON (17)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 301	V
17068	**SEMOUSSAC (17)**	CIA 17-79	Valide sans les parcelles 201, 204, 206 et 401	V
17069	**CHERMIGNAC (17)**	GROUPE ISIDOR	Essai trop hétérogène en densité	I
18059	**LAZENAY (18)**	TERRES INOVIA	Essai trop hétérogène	I
18061	**DAMPIERRE EN CROT (18)**	UCATA	Valide sans la parcelle 106	V
28056	**VILLAMPUY (28)**	RAGT SEMENCES	Valide sans les parcelles 101, 105 et 207	V
36057	**ST FLORENTIN (36)**	MAS SEEDS	Essai trop hétérogène	I
37060	**LIGRE (37)**	CA 37	Valide sans les parcelles 104, 108 et 109	V
37063	**LERNE (37)**	TERRENA	Valide sans restriction	V
41058	**CHAMPIGNY EN BEAUCE (41)**	MAS SEEDS	Trop hétérogène en stat	I
85066	**CHAMPAGNE LES MARAIS (85)**	CDPM	Valide sans les parcelles 301 et 409	V
85067	**TRIAIZE (85)**	CA 85	Valide sans B4	V
86062	**LES ORMES (86)**	AGRIAL	Valide sans les parcelles 202, 207 et 310	V
86070	**MESSEME (86)**	SYNGENTA	Valide sans la rep2, hétérogène en peuplement	V
86072	**LA ROCHE RIGAULT (86)**	LG SEMENCES	Levée trop hétérogène	I
TOTAL validés Regroupement CENTRE OUEST				**10**

Caractéristiques des variétés Précoce Oléiques

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
P	T	**ES IDILLIC**	Lidea	2015	**PS**	**PS**	**PS**	autre	Faible	Moyenne	Moyenne	P
P	T	**LG 50475HOV**	LG Semences	2021 - Italie	**TPS**	**MS**	**PS**	RM9# (DF)	Moyenne	Petite	Moyenne	P
MP	1A	**LID 1083H**	Lidea	2025	**TPS**	**PS**	**PS***	RM9#	Moyenne	Grosse	Moyenne	P
Début P	1A	**P62HH194**	Pioneer Semences	2025	**PS/TPS***	**PS***	**PS**	RM9	Elevée	Grosse	Haute	P
P	T	**P63HH165**	Pioneer Semences	2021 - Italie	**PS/TPS***	**PS**	**AS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Haute	MP
P	2A	**STABILO**	Soufflet Seeds	2024	**PS**	**TPS**	**AS***	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	P
Variétés issues du catalogue européen												
P/MP*	VCM	**LG 50515HOV**	LG Semences	2026 - Italie	-	**PS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P/MP
P	VCM	**LID 1088H**	Lidea	2026 - Italie	-	**MS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P
P	VCM	**LID1102H**	Lidea	2026 - Bulgarie	-	**MS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P
P	VCM	**RGT BROOKLLYN**	RAGT Semences	2026 - Italie	-	**MS/PS***	**PS**	RM9 (DF)	Elevée	Moyenne	Haute	P/MP

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
MS/PS	Moyen à peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible

T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
P	Précoce
MP	Mi-Précoce
*	Donnée à confirmer

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)

Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.


Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%) données nationales	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
P62HH194 (1A)	Début P	**102.5**	7.3	7/11	105.1	47.1	90.3 ±0.8	32.8	5.6	48.3	122	28-juin
P63HH165 (T)	P	**99.7**	5.9	5/11	99.6	45.2	89.0 ±2.3	31.8	6.3	40.1	119	1-juil.
LG 50475HOV (T)	P	**99.2**	4.3	5/11	98.1	45.0	88.2 ±0.9	31.3	6.6	35.0	117	27-juin
LID 1083H (1A)	MP	**98.1**	6.6	4/11	98.0	45.6	87.9 ±1.1	34.4	6.2	48.4	112	27-juin
ES IDILLIC (T)	P	**97.2**	8.1	3/11	91.8	43.3	88.1 ±0.9	31.6	6.7	40.7	114	27-juin
Variétés issues du catalogue européen												
RGT BROOKLLYN (VCM)	P	**104.7**	9.7	7/11	109.0	47.3	89.1 ±1.0	33.6	6.9	39.8	118	30-juin
LG 50515HOV (VCM)	P/MP*	**104.3**	5.8	10/11	103.0	44.9	88.0 ±0.6	30.9	7.3	38.8	118	30-juin
LID 1102H (VCM)	P	**98.5**	5.8	5/11	99.4	46.0	88.1 ±1.0	33.4	6.1	46.7	115	29-juin
LID 1088H (VCM)	P	**95.8**	4.8	2/11	95.9	45.3	89.6 ±0.8	33.9	6.8	45.3	118	27-juin
Effectif		11			**10**	**10**	**8**	**7**	**11**	**10**	**8**	**10**
Moyenne		**28.8 q/ha**			**1.2 t/ha**	**45.5 %**	**88.7 %**	**32.6 %**	**6.5 %**	**42.6 g**	**117 cm**	**28-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire

Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Précoce oléique Est"

11 essais,

Rendement moyen de la série : 28,9q/ha



Série Précoce oléique EST

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	MISERIEUX - 01600	MAUREGNY EN HAYE - 02820	VIREY SOUS BAR - 10260	BROINDON - 21220	ST QUENTIN SUR COOLE - 51240	LEFFONDS - 52210	ROSIERES EN HAYE - 54385	BEUREY SUR SAULX - 55000	VEYRE MONTON - 63960	EFFIAT - 63260	ORMOY - 89400	Indice moyen
Organisme partenaire	OXYANE	CA 02	SOUFFLET AGRICULTURE	TERRES INOVIA	TERRES INOVIA	EMC2	TERRES INOVIA	NORD NEGOCE	LIMAGRAIN COOP	UCAL	TERRES INOVIA	
Code essai	01074	02047	10053	21055	51052	52051	54102	55048	63073	63075	89054	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
ES IDILLIC	96.3	108.1	98.1	80.2	91.6	98.7	108.6	100.3	98.6	99.2	89.2	97.2
LG 50475HOV	100.4	93.2	106.0	98.1	99.3	105.5	96.3	100.2	100.9	92.1	99.3	99.2
LID 1083H	94.2	107.9	104.1	102.9	99.5	90.1	85.6	99.0	95.0	103.4	97.2	98.1
P62HH194	109.4	106.3	86.6	101.9	108.1	95.5	111.4	107.7	97.6	99.3	104.1	102.5
P63HH165	108.5	96.1	106.1	93.0	94.8	103.8	98.6	92.4	105.0	93.9	104.1	99.7
Variétés issues du catalogue européen												
LG 50515HOV	102.8	103.5	100.8	106.6	100.4	116.8	108.8	102.4	106.7	104.9	93.7	104.3
LID 1088H	98.9	91.5	91.3	105.0	93.3	95.6	95.8	91.4	92.6	94.1	103.8	95.8
LID 1102H	95.5	99.5	90.1	106.1	90.9	96.4	102.9	101.7	93.2	107.2	100.2	98.5
RGT BROOKLLYN	94.0	94.0	116.7	106.3	122.0	97.5	92.0	104.9	110.4	105.9	108.4	104.7
Moyenne (q/ha)	**48.8**	**34.9**	**29.3**	**17.5**	**21.4**	**23.1**	**35.6**	**36.1**	**15.5**	**25.2**	**28.9**	
Informations Itinéraire Technique												
Date de semis	22 avr.	25 avr.	07 avr.	09 avr.	09 avr.	07 avr.	09 avr.	16 avr.	22 avr.	10 avr.	10 avr.	
Date de récolte	14 sept.	18 sept.	11 sept.	08 sept.	08 sept.	29 sept.	27 août	15 sept.	22 sept.	07 sept.	04 sept.	
Précédent	Maïs Grain	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Orge d'hiver	
Texture	Limoneux	Sable	Argilo calcaire moyen	Argilo-limoneux	Craie de Champagne	Limon argileux	Argilo-limoneux	Argilo-sablo-limoneux	Argile	Argilo calcaire intermédiaire à profond	Argilo-limoneux	
Dose d'azote (U/ha)	29	42	33	65	-	-	40	-	64	35	50.7	
Irrigation	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	


(-) données manquantes

Productivité – rendement graines - variétés Précoces Oléiques regroupement CENTRE OUEST

Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%) données nationales	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
P63HH165 (T)	P	**103.8**	7.4	7/10	101.0	44.0	89.0 ±2.3	29.3	6.3	44.0	119	29-juin
LID 1083H (1A)	MP	**102.0**	7.5	6/10	104.8	45.4	87.9 ±1.1	31.2	6.9	47.8	108	27-juin
P62HH194 (1A)	Début P	**99.6**	7.2	6/10	102.0	46.0	90.3 ±0.8	30.6	6.0	45.9	118	26-juin
ES IDILLIC (T)	P	**99.3**	6.4	3/10	96.0	43.1	88.1 ±0.9	28.7	7.3	42.6	109	26-juin
LG 50475HOV (T)	P	**96.8**	7.9	2/10	94.9	44.2	88.2 ±0.9	28.7	6.7	37.9	111	26-juin
STABILO (2A)	P	**96.8**	7.2	3/10	96.2	45.0	89.7 ±0.9	30.1	6.4	42.6	118	27-juin
Variétés issues du catalogue européen												
RGT BROOKLLYN (VCM)	P	**103.4**	8.9	8/10	106.3	46.2	89.1 ±1.0	30.7	7.3	42.6	120	28-juin
LG 50515HOV (VCM)	P/MP*	**103.1**	6.3	9/10	100.8	44.2	88.0 ±0.6	28.6	7.4	41.8	117	28-juin
LID 1102H (VCM)	P	**97.9**	8.5	3/10	99.2	44.9	88.1 ±1.0	30.4	6.4	45.4	112	28-juin
LID 1088H (VCM)	P	**97.2**	5.3	3/10	98.7	45.1	89.6 ±0.8	30.9	7.5	47.0	111	27-juin
Effectif		10			**8**	**8**	**8**	**7**	**10**	**6**	**7**	**8**
Moyenne		**25.6 q/ha**			**1.1 t/ha**	**44.8 %**	**88.7 %**	**29.9 %**	**6.8 %**	**43.8 g**	**114 cm**	**27-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire


Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Précoce oléique Ouest"
10 essais,
Rendement moyen de la série : 25,6q/ha
Variété (Statut) Préco maturité
Indice de rendement (% de la moyenne des essais)
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription
P63HH165 (T) P
LID 1083H (1A) MP
P62HH194 (1A) Début P
ES IDILLIC (T) P
STABILO (2A) P
LG 50475HOV (T) P
Variétés Européennes première année d'évaluation
RGT BROOKLLYN (UE) P
LG 50515HOV (UE) P/MP*
LID 1102H (UE) P
LID 1088H (UE) P
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Indice moyen 2026
CHAMBON)17)
SEMOUSSAC (17)
DAMPIERRE EN CROT (18)
VILLAMPUY (28)
LIGRE (37)
LERNE (37)
CHAMPAGNE LES MARAIS (85)
TRIAIZE (85)
MESSEME (86)
LES ORMES (86)

Série Précoce oléique CENTRE OUEST

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	CHAMBON - 17290	SEMOUSSAC - 17150	DAMPIERRE EN CROT - 18260	VILLAMPUY - 28200	LIGRE - 37500	LERNE - 37500	CHAMPAGNE LES MARAIS - 85450	TRIAIZE - 85580	LES ORMES - 86220	MESSEME - 86200	Indice moyen
Organisme partenaire	**TERRES INOVIA**	**CA 17-79**	**UCATA**	**RAGT SEMENCES**	**CA 37**	**TERRENA**	**CDPM 85**	**CA 85**	**AGRIAL**	**SYNGENTA**	
Code essai	17064	17068	18061	28056	37063	37060	85066	85067	86062	86070	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription											
ES IDILLIC	94.0	93.6	96.4	102.6	106.0	95.6	98.6	99.8	93.3	113.4	99.3
LG 50475HOV	98.7	100.3	84.8	99.8	84.7	93.3	99.8	97.6	97.5	111.7	96.8
LID 1083H	109.3	107.2	102.8	100.9	105.7	99.2	97.0	91.7	91.4	114.6	102.0
P62HH194	102.5	101.4	85.0	97.9	102.3	109.9	96.0	107.7	101.0	92.5	99.6
P63HH165	97.4	91.3	102.9	99.0	100.7	105.1	108.9	104.0	116.2	112.9	103.8
STABILO	95.7	99.4	88.9	98.7	93.7	95.1	106.8	103.9	102.8	83.0	96.8
Variétés issues du catalogue européen											
LG 50515HOV	105.0	89.7	113.0	103.0	100.5	100.9	102.6	104.1	110.5	102.0	103.1
LID 1088H	94.4	95.2	98.5	97.6	108.3	94.6	92.0	101.5	90.1	100.2	97.2
LID 1102H	97.1	113.0	106.1	97.7	97.2	104.7	95.0	94.9	91.3	82.2	97.9
RGT BROOKLLYN	106.1	108.9	121.7	102.9	100.9	101.6	103.3	94.7	106.0	87.6	103.4
Moyenne (q/ha)	**17.9**	**14.7**	**11.6**	**28.2**	**33.4**	**25.7**	**33.2**	**39.9**	**35.6**	**15.6**	
Informations Itinéraire Technique											
Date de semis	03 avr.	11 mai	20 avr.	02 avr.	12 mai	07 avr.	10 avr.	02 avr.	14 avr.	09 mai	
Date de récolte	06 août	18 sept.	10 sept.	12-août	04 sept.	07 sept.	09 sept.	19 août	04 sept.	14 sept.	
Précédent	Blé tendre d'hiver	-	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	-	Céréales à paille	Blé dur	Blé dur	Blé tendre d'hiver	Blé dur	
Texture	Argilo-limoneux	Argilo-limoneux	Limon	Limono-argileux	Limono-argileux	Argilo-calcaire moyen	Argile limoneuse	Argile	Sablo-limoneux	Limono-argileux	
Dose d'azote (U/ha)	50	46	-	-	60	-	46	60	-	50	
Irrigation	non	non	non	65	non	-	non	non	5 tours d'eau qté?	non	

(-) données manquantes


Réseau PRECOCE oléique Tolérantes herbicides (VrTH)

10 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :


Série Précoce Oléique VrTH EST			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	12	1	11
Localisation : département (nb d'essais)	01, 10, 21(x2), 26, 51, 52, 54(x2), 55, 63, 89	54	01, 10, 21(x2), 26, 51, 52, 54, 55, 63, 89

Série Précoce Oléique VrTH CENTRE-OUEST			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	12	5	7
Localisation : département (nb d'essais)	16(x2), 17, 18(x3), 36, 41, 45, 49, 86(x2)	16(x2), 18, 49, 86	17, 18(x2), 36, 41, 45, 86

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau précoce Oléique VrTH EST



Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau précoce Oléique VrTH CENTRE-OUEST



Contacts régionaux :

- **Alexandra Denoyelle –** Auvergne – Rhône-Alpes a.denoyelle@terresinovia.fr
- **Aurore Baillet** – Lorraine, Alsace, Haute-Marne a.baillet@terresinovia.fr
- **Mathieu Dulot** – Champagne-Ardenne, Seine-et-Marne m.dulot@terresinovia.fr
- **Nicolas Latraye** – Hauts-de-France n.latraye@terresinovoa.fr
- **Victoire Lefèvre –** Bourgogne – Franche-Comté v.lefevre@terresinovia.fr

Contacts régionaux :

- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin e.tourton@terresinovia.fr
- **Jean Lieven –** Normandie / Ile-de-France Ouest j.lieven@terresinovia.fr
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire j.charbonnaud@terresinovia.fr
- **Thomas Mear** – Bretagne/Pays-de-la-Loire t.mear@terresinovia.fr

Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
01098	**VILLENEUVE (01)**	OXYANE	Valide sans restriction	V
10053	**VIREY SOUS BAR (10)**	SOUFFLET AGRICULTURE	Valide sans restriction	V
21103	**EPOISSES (21)**	LIDEA	Valide sans les parcelles 112, 202, 203, 204, 210, 304 pb peuplement, verse.	V
21009	**BROINDON (21)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 108	V
26100	**ST PAUL LES ROMANS (26)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 104	V
51005	**ST QUENTIN SUR COOLE (51)**	TERRES INOVIA	Valide sans restriction	V
52003	**LEFFONDS (52)**	EMC2	Valide sans la parcelle 204	V
54001	**GERBECOURT ET HAPLEMONT (54)**	CAL/EPILOR	Dégâts d'oiseaux à la levée	I
54002	**ROSIERES EN HAYE (54)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 203 et 205	V
55048	**BEUREY SUR SAULX (55)**	NORD NEGOCE	Valide sans restriction	V
63099	**EFFIAT (63)**	UCAL	Valide sans restriction	V
89007	**ORMOY (89)**	TERRES INOVIA	Valide sans restriction	V
TOTAL validés Regroupement EST				**11**
16093	**PALLUAUD (16)**	CA 16	Essai trop hétérogène en densité.	I
16094	**COURCOME (16)**	NEOLIS	Essai trop hétérogène en lien avec les passages d'enrouleur dans l'essai	I
17016	**CHAMBON (17)**	TERRES INOVIA	Valide sans restriction	V
18010	**LAZENAY (18)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 101, 107 et 303	V
18011	**LE SUBDRAY (18)**	AXEREAL	Essai trop hétérogène en stat	I
18012	**LEVET (18)**	FDGEDA DU CHER	Valide sans les variétés SUMERIO, SY IRISA, SY MULANO, et parcelles 101, 102 et 311	V
36013	**LA CHAMPENOISE (36)**	CA 36	Valide sans la parcelle 311	V
41014	**VILLEROMAIN (41)**	AGRO CENTRE	Valide sans la parcelle 208	V
45015	**OUTARVILLE (45)**	MAS SEEDS	Valide sans les parcelles 110, 114, 202, 206, 217, 304 et 307	V
49097	**MAUGES SUR LOIRE (49)**	RAGT SEMENCES	Trop hétérogène en stat	I
86095	**MESSEME (86)**	SYNGENTA	Valide sans la parcelle 105	V
86096	**LA ROCHE RIGAULT (86)**	LG SEMENCES	Levée trop hétérogène	I
TOTAL validés Regroupement CENTRE OUEST				**7**

Caractéristiques des variétés Précoce Oléiques VrTH

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
P	T	**LG 50475HOV**	LG Semences	2021 - Italie	**TPS**	**MS**	**PS**	RM9# (DF)	Moyenne	Petite	Moyenne	P
MP	T	**SUMERIO**	Syngenta	2021 - Portugal	**PS/TPS***	**TPS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	MP
P	1A	**LG 50487HOV CLP**	LG Semences	2024 – Italie	**TPS**	**PS**	**AS***	RM9#	Moyenne	Petite	Moyenne	MP
P	1A	**LG 50540HOV CLP**	LG Semences	2024 – Italie	**PS**	**PS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Grosse	Moyenne	P
P	1A	**LID 1062H CLP**	Lidea	2024 - Italie	**TPS**	**PS**	**AS***	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	MP
Variétés issues du catalogue européen												
P	VCM	**LG 50459HOV SX**	LG Semences	2025 – Italie	**TPS***	**S**	**AS/PS***	RM9#	Faible	Moyenne	Haute	MP
Début P	VCM	**LID 1054H SU**	Lidea	2025 – Italie	-	**PS**	**PS**	RM9#	Moyenne	Petite	Haute	P
P	VCM	**P63HE189**	Pioneer Semences	2025 – Ukraine	**TPS***	**MS***	**AS/PS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
P	VCM	**P63HE203**	Pioneer Semences	2025 - Italie	-	**MS**	**PS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P
MP	VCM	**SY MULANO AR**	Syngenta	2025 - Italie	-	**MS***	**PS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	P/MP

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
MS/PS	Moyen à peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible
*	Donnée à confirmer


T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
P	Précoce
MP	Mi-Précoce
	Tribénuron-méthyl
	Clearfield plus
	Technologie AIR

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)

Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%) données nationales	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
LG 50540HOV CLP (1A)	P	**108.1**	6.3	9/11	111.9	45.4	88.1 ±1.9	33.4	7.1	49.1	118	25-juin
LID 1062H CLP (1A)	P	**104.0**	9.0	6/10	101.8	43.6	88.5 ±1.0	32.1	7.2	39.6	128	29-juin
LG 50487 CLP (1A)	P	**102.9**	6.4	7/11	103.8	44.2	88.9 ±0.9	33.0	6.8	37.4	121	28-juin
LG 50475HOV (T)	P	**99.6**	5.2	5/11	99.3	44.0	88.3 ±0.8	31.2	6.6	35.4	120	25-juin
SUMERIO (T)	MP	**98.6**	7.1	4/11	97.8	43.7	89.1 ±0.8	31.6	7.6	40.9	125	29-juin
Variétés issues du catalogue européen												
P63HE189 (VCM)	P	**100.7**	9.0	5/11	101.8	44.1	88.5 ±1.2	32.0	6.5	43.8	120	28-juin
LG 50459HOV SX (VCM)	P	**100.4**	5.6	7/11	98.7	43.1	87.6 ±1.1	31.1	6.7	34.5	125	28-juin
SY MULANO AR (VCM)	MP	**96.5**	7.3	4/11	95.6	43.8	88.7 ±0.8	32.4	7.3	41.2	128	27-juin
P63HE203 (VCM)	P	**96.3**	11.4	5/11	95.8	43.7	88.3 ±1.4	32.4	6.1	45.6	122	25-juin
LID 1054H SU (VCM)	Début P	**93.1**	9.4	2/11	93.9	44.5	88.4 ±1.0	32.9	6.0	34.0	126	24-juin
Effectif		11			**10**	**10**	**8**	**9**	**11**	**10**	**8**	**8**
Moyenne		**30.1 q/ha**			**1.3 t/ha**	**44.0 %**	**88.5 %**	**32.2 %**	**6.8 %**	**40.2 g**	**126 cm**	**27-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire


Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Précoce oléique VrTH Est"
11 essais,
Rendement moyen de la série : 30,1 q/ha
Variété (Statut) Préco maturité
Indice de rendement (% de la moyenne des essais)
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription
Variétés Européennes première année d'évaluation
LG 50540HOV CLP (1A) P
LID 1062H CLP (1A) P
LG 50487 CLP (1A) P
LG 50475HOV (T) P
SUMERIO (T) MP
P63HE189 (UE) P
LG 50459HOV SX (UE) P
SY MULANO AR (UE) MP
P63HE203 (UE) P
LID 1054H SU (UE) Début P
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Indice moyen 2026
MISERIEUX (01)
VIREY SOUS BAR (10)
BROINDON (21)
EPOISSES (21)
ST PAUL LES ROMANS (26)
ST QUENTIN SUR COOLE (51)
LEFFONDS (52)
ROSIERES EN HAYE (54)
BEUREY SUR SAULX (55)
EFFIAT (63)
ORMOY (89)

Série Précoce oléique VrTH EST

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	MISERIEUX - 01600	VIREY SOUS BAR - 10260	BROINDON - 21220	EPOISSES - 21460	ST PAUL LES ROMANS - 26750	ST QUENTIN SUR COOLE - 51240	LEFFONDS - 52210	ROSIERES EN HAYE - 54385	BEUREY SUR SAULX - 55000	EFFIAT - 63260	ORMOY - 89400	Indice moyen
Organisme partenaire	OXYANE	SOUFFLET AGRICULTURE	TERRES INOVIA	LIDEA	TERRES INOVIA	TERRES INOVIA	EMC2	TERRES INOVIA	NORD NEGOCE	UCAL	TERRES INOVIA	
Code essai	1098	10053	21009	21103	26100	51005	52003	54002	55048	63099	89007	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
LG 50475HOV	97.1	105.2	100.0	96.8	87.7	107.2	102.2	96.9	99.9	100.5	102.6	99.6
LG 50487 CLP	99.1	117.9	107.3	97.9	102.6	93.2	105.2	101.4	99.6	105.2	103.0	102.9
LG 50540HOV CLP	99.8	111.7	103.5	100.4	117.0	112.0	112.8	99.8	107.8	110.6	114.2	108.1
LID 1062H CLP	108.1	-	115.1	93.8	94.2	91.7	109.1	96.0	112.2	107.4	112.5	104.0
SUMERIO	99.4	106.9	87.3	93.1	105.0	110.1	101.5	89.3	99.4	97.2	95.8	98.6
Variétés issues du catalogue européen												
LG 50459HOV SX	94.1	112.4	102.1	101.0	95.7	91.3	101.5	102.2	99.2	100.7	103.8	100.4
LID 1054H SU	93.9	79.9	87.7	107.0	80.0	98.5	83.6	106.0	95.4	96.5	95.1	93.1
P63HE189	103.7	92.4	107.7	116.1	113.6	98.7	102.3	99.3	92.0	92.8	89.3	100.7
P63HE203	103.9	73.6	104.2	103.5	95.9	105.1	76.6	108.2	96.0	98.4	94.2	96.3
SY MULANO AR	100.8	99.9	85.1	90.5	108.2	92.2	105.2	100.9	98.5	90.7	89.5	96.5
Moyenne (q/ha)	**51.2**	**29.6**	**15.0**	**37.1**	**27.5**	**20.2**	**23.0**	**36.2**	**36.3**	**26.8**	**28.4**	
Informations Itinéraire Technique												
Date de semis	22 avr.	07 avr.	09 avr.	22 avr.	10 avr.	09 avr.	07 avr.	09 avr.	16 avr.	10 avr.	10 avr.	
Date de récolte	14 sept.	11 sept.	08 sept.	10 sept.	10 août	08 sept.	29 sept.	27 août	15 sept.	07 sept.	04 sept.	
Précédent	Maïs Grain	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Maïs Grain	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Orge d'hiver	
Texture	Limoneux	Argilo calcaire moyen	Argilo-limoneux	Limon	Argilo-sablo-limoneux	Craie de champagne	Limon argileux	Argilo-limoneux	Argilo-sablo-limoneux	Argilo calcaire intermédiaire à profond	Argilo-limoneux	
Dose d'azote (U/ha)	29	33	65	43	50	-	-	40	-	35	50.7	
Irrigation	non	-	non	-	190	non	non	non	non	non	non	

(-) données manquantes

Productivité – rendement graines - variétés Précoces Oléiques VrTH regroupement CENTRE OUEST

Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.


Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%) données nationales	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
LG 50540HOV CLP (1A)	P	**112.8**	7.2	7/7	117.8	46.0	88.1 ±1.9	32.0	7.4	37.0	109	25-juin
LG 50475HOV (T)	P	**103.4**	6.5	5/7	101.2	43.5	88.3 ±0.8	30.4	6.2	32.3	112	24-juin
LID 1062H CLP (1A)	P	**102.8**	5.1	4/7	100.5	43.2	88.5 ±1	30.8	7.7	34.0	120	28-juin
LG 50487 CLP (1A)	P	**101.8**	5.1	5/7	100.8	43.7	88.9 ±0.9	31.1	7.3	35.3	110	28-juin
SUMERIO (T)	MP	**95.8**	13.4	2/6	100.0	43.7	89.1 ±0.8	30.7	10.2	36.0	111	28-juin
Variétés issues du catalogue européen												
LG 50459HOV SX (VCM)	P	**101.5**	6.2	5/7	98.8	43.2	87.6 ±1.1	30.4	6.4	32.2	114	27-juin
P63HE203 (VCM)	P	**99.1**	10.9	4/7	95.9	43.5	88.3 ±1.4	29.2	6.1	37.2	113	26-juin
P63HE189 (VCM)	P	**95.6**	4.1	0/7	94.2	43.5	88.5 ±1.2	30.1	7.5	36.4	112	28-juin
LID 1054H SU (VCM)	Début P	**94.1**	5.9	0/7	94.1	44.6	88.4 ±1	30.6	6.3	29.5	112	25-juin
SY MULANO AR (VCM)	MP	**91.2**	11.6	2/6	95.9	43.9	88.7 ±0.8	31.8	10.6	35.9	118	27-juin
Effectif		7			**6**	**6**	**8**	**5**	**6**	**5**	**8**	**8**
Moyenne		**22.7 q/ha**			**1.1 t/ha**	**43.9 %**	**88.5 %**	**30.6 %**	**7.6 %**	**34.5 g**	**113 cm**	**27-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire

Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Précoce oléique VrTH Ouest"

7 essais,

Rendement moyen de la série : 22,7 q/ha



Série Précoce oléique VrTH CENTRE OUEST

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	CHAMBON - 17290	LAZENAY - 18120	LEVET - 18340	LA CHAMPENOISE - 36100	VILLEROMAIN - 41100	OUTARVILLE - 45480	MESSEME - 86200	Indice moyen
Organisme partenaire	TERRES INOVIA	TERRES INOVIA	FDGEDA 18	CA 36	AGRO CENTRE	MAS SEEDS	SYNGENTA	
Code essai	17016	18010	18012	36013	41014	45015	86095	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription								
LG 50475HOV	95.6	113.8	95.7	108.6	104.1	102.9	103.2	103.4
LG 50487 CLP	104.9	104.3	102.2	105.0	93.1	106.6	96.4	101.8
LG 50540HOV CLP	115.8	121.0	114.6	114.0	102.0	103.7	118.6	112.8
LID 1062H CLP	99.2	95.6	107.5	108.2	105.2	97.7	106.2	102.8
SUMERIO	96.4	113.6	-	75.9	107.1	88.5	93.4	95.8
Variétés issues du catalogue européen								
LG 50459HOV SX	106.6	90.9	104.9	106.9	103.0	103.3	94.9	101.5
LID 1054H SU	96.2	95.8	82.6	99.7	89.9	96.8	97.7	94.1
P63HE189	89.6	96.4	96.1	98.1	99.2	90.2	99.7	95.6
P63HE203	108.6	83.7	96.5	110.2	100.6	108.2	86.0	99.1
SY MULANO AR	87.0	84.8	-	73.5	95.8	102.0	104.0	91.2
Moyenne (q/ha)	**16.0**	**17.5**	**25.3**	**15.8**	**37.8**	**31.1**	**15.6**	
Informations Itinéraire Technique								
Date de semis	03 avr.	23 avr.	07 avr.	13 avr.	16 avr.	14 avr.	09 mai	
Date de récolte	06 août	11 sept.	15 août	19 août	09 sept.	01 sept.	14 sept.	
Précédent	Blé tendre d'hiver	Orge d'hiver	Orge de printemps	Orge d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé dur	Blé dur	
Texture	Argilo-limoneux	-	Limon-sableux	argilo-calcaire	Limon argileux	Limon argileux	Limono-argileux	
Dose d'azote (U/ha)	50	-	-	0	-	0	50	
Irrigation	non	non	non	non	-	non	non	

(-) données manquantes

Réseau MI-PRECOCE / MI-TARDIF oléique


4 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :

Regroupement national			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	15	5	10
Localisation : département (nb d'essais)	16, 17(x2), 26, 31(x2), 32(x2), 36, 37, 47(x2), 81, 82, 86	31, 32, 36, 82, 86	16, 17(x2), 26, 31, 32, 37, 47(x2), 81

Contacts régionaux :

- **Alexandra Denoyelle –** Auvergne – Rhône-Alpes (a.denoyelle@terresinovia.fr)
- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin (e.tourton@terresinovia.fr)
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire (j.charbonnaud@terresinovia.fr)
- **Quentin Lambert** – Ouest Occitanie (q.lambert@terresinovia.fr)
- **Quentin Level** – Sud Nouvelle Aquitaine, Gers, Hautes-Pyrénées (q.level@terresinovia.fr)

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau Mi-précoce / mi-tardif Oléique



Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
16018	**COURCOME (16)**	NEOLIS	Valide sans restriction	V
17019	**SEMOUSSAC (17)**	CIA 17-79	Valide sans les parcelles 105, 204 et 302	V
17020	**MONTROY (17)**	SYNGENTA	Valide sans restriction	V
26030	**ST PAUL LES ROMANS (26)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 301	V
31026	**MAUVAISIN (31)**	TERRES INOVIA	Valide sans le bloc ligne 3	V
31028	**LEVIGNAC (31)**	PIONEER SEMENCES	Trop hétérogène en stat	I
82029	**VERDUN SUR GARONNE (82)**	LIDEA	Orage après semis, croute de battance trop importante	I
32023	**CONDOM (32)**	TERRES INOVIA	Trop hétérogène	I
32025	**PAUILHAC (32)**	SYNGENTA	Valide sans restriction	V
36101	**ST FLORENTIN (36)**	MAS SEEDS	Essai trop hétérogène	I
37017	**LERNE (37)**	TERRENA	Valide sans les parcelles 101 et 102	V
47022	**ASTAFFORT (47)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 307	V
47024	**DURAS (47)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 102, 202 et 307	V
81027	**GAILLAC (81)**	RAGT SEMENCES	Valide sans restriction	V
86021	**LA ROCHE RIGAULT (86)**	LG SEMENCES		I
			TOTAL validés	**10**

Caractéristiques des variétés MI-PRECOCE / MI-TARDIVE oléique

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
MP	2A	**LG 50626HOV**	LG Semences	2024 - Italie	**TPS***	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
MP	T	**P64HH167**	Pioneer Semences	2020	**PS**	**MS/PS**	**AS**	RM9	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
MT	T	**SY CELESTO**	Syngenta	2019	**PS**	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
Variété issue du catalogue européen												
MT	VCM	**LG 50646HOV**	LG Semences	2026 - Italie	**-**	**TPS***	**AS**	RM9#	Élevée	Moyenne	Moyenne	MP

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
AS/PS	Assez sensible/ Peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible

T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
MP	Mi-Précoce
MT	Mi-Tardive
*	Donnée à confirmer

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)


Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%)	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
P64HH167 (T)	MP	**102.0**	7.2	6/10	97.1	42.3	87.0 ±2.1	32.4	7.5	42.6	128	27-juin
SY CELESTO (T)	MT	**101.8**	5.4	8/10	102.7	44.3	87.3 ±2.0	34.3	7.4	42.3	126	25-juin
LG 50626HOV (2A)	MP	**95.6**	8.3	4/10	96.9	44.0	88.2 ±1.1	33.2	7.6	43.4	124	26-juin
Variété issue du catalogue européen												
LG 50646HOV (VCM)	MT	**100.5**	4.6	5/10	103.3	45.1	85.3 ±1.1	34.2	8.3	43.4	118	26-juin
Effectif		10			**9**	**9**	**7**	**7**	**10**	**8**	**11**	**10**
Moyenne		**24.9 q/ha**			**1.1 t/ha**	**43.9 %**	**87.0 %**	**33.5 %**	**7.7 %**	**42.9 g**	**124 cm**	**26-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire

Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Mi-Précoce oléique"

10 essais,
Rendement moyen de la série : 24,9q/ha



Série Mi-précoce/ Mi-tardive oléique

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	COURCOME - 16240	SEMOUSSAC - 17150	MONTROY - 17220	ST PAUL LES ROMANS - 26750	MAUVAISIN - 31190	FLEURANCE - 32500	LERNE - 37500	ASTAFFORT - 47220	DURAS - 47120	SENOUILLAC - 81600	Indice moyen
Organisme partenaire	**NEOLIS**	**CA 17-79**	**SYNGENTA**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**SYNGENTA**	**TERRENA**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**RAGT SEMENCES**	
Code essai	16018	17019	17020	26030	31026	32025	37017	47022	47024	81027	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription											
LG 50626HOV	101.5	102.1	103.5	91.8	79.5	96.6	99.1	104.4	92.9	85.2	95.6
P64HH167	100.3	96.2	104.6	106.2	110.5	94.4	106.6	94.8	93.0	113.2	102.0
SY CELESTO	100.0	99.2	90.7	103.6	104.2	100.9	102.8	102.4	112.6	101.9	101.8
Variété issue du catalogue européen											
LG 50646HOV	98.2	102.5	101.3	98.3	105.8	108.2	91.5	98.4	101.5	99.7	100.5
Moyenne (q/ha)	**35.2**	**14.0**	**21.3**	**32.1**	**18.6**	**18.4**	**27.0**	**31.2**	**33.7**	**17.7**	
Informations Itinéraire Technique											
Date de semis	08 avr.	11 mai	10 avr.	10 avr.	21 avr.	21 avr.	12 mai	21 avr.	16 avr.	09 avr.	
Date de récolte	08 sept.	18 sept.	20 août	10 août	10 sept.	20 août	04 sept.	04 sept.	02 sept.	11-août	
Précédent	Blé tendre d'hiver	-	Blé dur	Blé tendre d'hiver	-	Blé dur	-	Blé tendre d'hiver	Soja	Blé tendre d'hiver	
Texture	Limono-argileux	Argilo-limoneux	Argilo-limoneux	Argilo-sablo-limoneux	-	Argile	Limono-argileux	Argile limono-sableuse	Argilo-limoneux	Argileux	
Dose d'azote (U/ha)	-	46	50	50	50	65	60	60	80	-	
Irrigation	150	non	non	190	non	non	non	80	40	non	

(-) données manquantes

Réseau MI-PRECOCE / MI-TARDIF oléique Tolérantes herbicides (VrTH)


9 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :

Regroupement national			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	14	5	9
Localisation : département (nb d'essais)	16, 17(x5), 18, 31(x2), 32, 47, 81, 82, 85	17(x2), 31, 32, 82	16, 17(x3), 18, 31, 47, 81, 85

Contacts régionaux :

- **Alexandra Denoyelle –** Auvergne – Rhône-Alpes (a.denoyelle@terresinovia.fr)
- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin (e.tourton@terresinovia.fr)
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire (j.charbonnaud@terresinovia.fr)
- **Quentin Lambert** – Ouest Occitanie (q.lambert@terresinovia.fr)
- **Quentin Level** – Sud Nouvelle Aquitaine, Gers, Hautes-Pyrénées (q.level@terresinovia.fr)

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau Mi-précoce / mi-tardif Oléique VrTH



Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
16080	**COURCOME (16)**	NEOLIS	Valide sans les parcelles 203 et 408	V
17078	**CHAMBON (17)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 201	V
17081	**SEMOUSSAC (17)**	CIA 17-79	Trop hétérogène agronomiquement, peuplement trop hétérogène	I
17082	**ST SEURIN DE PALENNE (17)**	SOUFFLET SEEDS	Levée trop hétérogènn	I
17083	**MONTROY (17)**	SYNGENTA	Valide sans restriction	V
17084	**THENAC (17)**	KWS MAIS FRANCE	Valide sans les parcelles 205, 209 et 309	V
18077	**LAZENAY (18)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 205, 303 et 305	V
31088	**MONTLAUR (31)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 201, 303, 304, 306	V
31090	**LEVIGNAC (31)**	PIONEER SEMENCES	Trop hétérogène et trop de parcelles manquantes	I
32085	**CONDOM (32)**	TERRES INOVIA	Trop hétérogène	I
47086	**PUYSSERAMPION (47)**	TERRES DU SUD	Valide sans restriction	V
81089	**GAILLAC (81)**	RAGT SEMENCES	Valide sans restriction	V
82091	**VERDUN SUR GARONNE (82)**	LIDEA	Orage après semis, croute de battance trop importante	I
85079	**FONTENAY LE COMTE (85)**	CA 85	Valide sans restriction	V
			TOTAL validés	**9**

Caractéristiques des variétés MI-PRECOCE / MI-TARDIVE oléique VrTH

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
MP	2A	**LID 6038H CLP**	Lidea	2024 – Italie	**TPS***	**PS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
MP	2A	**P64HE188**	Pioneer Semences	2023 – Italie	**S/PS***	**PS**	**AS**	RM9	Élevée	Moyenne	Courte	MP
MT	T	**SY CELESTO**	Syngenta	2019	**PS**	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP
MP	T	**SY FLAVIO CLP**	Syngenta	2021 - Espagne	**S***	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Courte	MP
Variétés issues du catalogue européen												
MP	VCM	**DRAGSTER**	Soufflet Seeds	2026 - Slovaquie	-	**TPS**	**AS/PS***	RM9	Moyenne	Moyenne	Moyenne	MP/MT
MP	VCM	**LID 3019H CLP**	Lidea	2026 - Italie	-	**MS**	**PS**	RM9#	Faible	Grosse	Haute	MP
MT	VCM	**P64HE144**	Pioneer Semences	2019 - Ukraine	-	**PS/TPS***	**AS/PS**	RM9 (DF)	Faible	Moyenne	Haute	MP/MT
MT	VCM	**SULIANO HTS**	Syngenta	2023 - Roumanie	-	**MS**	**PS***	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	MP
MP	VCM	**SY ATILIO CLP**	Syngenta	2023 - Portugal	-	**PS**	**PS**	RM9#	Faible	Moyenne	Haute	MP

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
MS/PS	Moyen à peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible
*	Donnée à confirmer

T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
MP	Mi-Précoce
MT	Mi-Tardive
	Tribénuron-méthyl
	Clearfield plus

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)

Variétés classées par indice de rendement décroissant.


Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en acide oléique (%)	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
SY FLAVIO CLP (T)	MP	**105.2**	7.7	6/9	106.9	44.5	88.3 ±1.1	32.4	8.5	40.4	126	26-juin
LID 6038H CLP (2A)	MP	**104.3**	6.5	7/9	105.9	44.4	87.0 ±2.4	32.3	8.5	39.5	126	27-juin
SY CELESTO (T)	MT	**103.5**	5.8	6/9	104.9	45.1	87.1 ±2.2	32.4	8.1	40.0	123	28-juin
P64HE188 (2A)	MP	**100.2**	6.2	6/9	99.9	44.2	89.3 ±1.2	31.7	7.4	40.6	125	28-juin
Variétés issues du catalogue européen												
SULIANO HTS (VCM)	MT	**106.7**	3.7	9/9	109.4	44.8	87.9 ±1.5	30.3	9.1	38.3	130	29-juin
SY ATILIO CLP (VCM)	MP	**97.1**	6.9	3/9	93.8	43.1	90.1 ±1.3	30.8	8.4	38.5	128	27-juin
LID 3019H CLP (VCM)	MP	**96.7**	4.3	1/9	95.3	43.6	88.7 ±1.2	33.1	8.8	45.6	128	27-juin
P64HE144 (VCM)	MT	**94.4**	8.8	3/9	93.0	43.0	89.3 ±1.7	33.2	9.9	38.9	128	29-juin
DRAGSTER (VCM)	MP	**91.9**	9.0	0/9	90.9	44.1	88.3 ±1.2	33.6	7.7	40.3	124	29-juin
Effectif		**9**			**8**	**8**	**6**	**7**	**9**	**7**	**10**	**10**
Moyenne		**23.5 q/ha**			**0.9 t/ha**	**44.1 %**	**88.4 %**	**32.2 %**	**8.5 %**	**40.2 g**	**126 cm**	**28-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire

Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Mi-Précoce oléique VrTH"

9 essais,
Rendement moyen de la série : 23,5 q/ha



Série Mi-précoce/ Mi-tardive oléique VrTH

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	COURCOME - 16240	CHAMBON - 17290	MONTROY - 17220	THENAC - 17460	LAZENAY - 18120	MONTLAUR - 31450	PUYSSERAMPION - 47800	SENOUILLAC - 81600	FONTENAY LE COMTE - 85200	Indice moyen
Organisme partenaire	**NEOLIS**	**TERRES INOVIA**	**SYNGENTA**	**KWS MAIS FRANCE**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**TERRES DU SUD**	**RAGT SEMENCES**	**CA 85**	
Code essai	16080	17078	17083	17084	18077	31088	47086	81089	85079	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription										
LID 6038H CLP	101.8	98.1	102.2	112.4	113.0	95.7	102.0	111.8	101.2	104.3
P64HE188	101.0	103.9	111.1	101.2	88.9	101.5	96.3	102.2	95.4	100.2
SY CELESTO	100.7	105.2	97.3	99.7	108.1	109.6	100.7	97.0	113.2	103.5
SY FLAVIO CLP	104.7	104.5	97.4	106.4	121.7	96.0	99.6	108.6	107.6	105.2
Variétés issues du catalogue européen										
DRAGSTER	93.3	76.2	96.7	98.9	77.7	99.3	98.8	96.4	90.1	91.9
LID 3019H CLP	102.0	98.9	96.4	99.7	94.7	98.1	86.7	97.0	97.2	96.7
P64HE144	87.3	111.0	100.7	89.2	83.7	89.2	103.1	92.5	93.0	94.4
SULIANO HTS	112.4	104.9	106.0	104.6	102.9	106.0	111.0	102.3	110.2	106.7
SY ATILIO CLP	96.8	97.2	92.2	87.9	109.2	104.5	101.7	92.1	92.0	97.1
Moyenne (q/ha)	**36.5**	**13.3**	**22.9**	**21.1**	**15.5**	**44.9**	**15.0**	**17.4**	**24.8**	
Informations Itinéraire Technique										
Date de semis	08 avr.	03 avr.	10 avr.	13 mai	23 avr.	10 avr.	15 avr.	09 avr.	15 avr.	
Date de récolte	08 sept.	06 août	20 août	24 sept.	11 sept.	04 sept.	03 sept.	11-août	10 sept.	
Précédent	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé dur	Maïs Grain	Orge d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	
Texture	Limono-argileux	Argilo-limoneux	Argilo-limoneux	Argilo-limoneux	-	-	Limono-sablo-argileux	Argileux	Limono-argileux	
Dose d'azote (U/ha)	-	50	50	24	-	0	70	-	-	
Irrigation	150	non	non	40	non	-	non	non	non	

(-) données manquantes

Réseau PRECOCE linoléique Tolérantes herbicides (VrTH)


6 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :

Regroupement national			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	12	5	7
Localisation : département (nb d'essais)	16(x2), 17, 18(x3), 36, 41, 45, 49, 86(x2)	16(x2), 18, 49, 86	17, 18(x2), 36, 41, 45, 86

Contacts régionaux :

- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin e.tourton@terresinovia.fr
- **Jean Lieven –** Normandie / Ile-de-France Ouest j.lieven@terresinovia.fr
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire j.charbonnaud@terresinovia.fr
- **Thomas Mear** – Bretagne/Pays-de-la-Loire t.mear@terresinovia.fr

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau Précoce Linoléique VrTH



Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
16093	**PALLUAUD (16)**	CA 16	Essai trop hétérogène en densité.	I
16094	**COURCOME (16)**	NEOLIS	Essai trop hétérogène en lien avec les passages d'enrouleur dans l'essai	I
17016	**CHAMBON (17)**	TERRES INOVIA	Valide sans restriction	V
18010	**LAZENAY (18)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 101, 107 et 303	V
18011	**LE SUBDRAY (18)**	AXEREAL	Essai trop hétérogène en stat	I
18012	**LEVET (18)**	FDGEDA DU CHER	Valide sans les variétés SUMERIO, SY IRISA, SY MULANO, et parcelles 101, 102 et 311	V
36013	**LA CHAMPENOISE (36)**	CA 36	Valide sans la parcelle 311	V
41014	**VILLEROMAIN (41)**	AGRO CENTRE	Valide sans la parcelle 208	V
45015	**OUTARVILLE (45)**	MAS SEEDS	Valide sans les parcelles 110, 114, 202, 206, 217, 304 et 307	V
49097	**MAUGES SUR LOIRE (49)**	RAGT SEMENCES	Trop hétérogène en stat	I
86095	**MESSEME (86)**	SYNGENTA	Valide sans la parcelle 105	V
86096	**LA ROCHE RIGAULT (86)**	LG SEMENCES	Levée trop hétérogène	I
			TOTAL validés	**7**

Caractéristiques des variétés PRECOCE Linoléiques VrTH

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variété Française ou européenne ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
MP	T	**LG 50479 SX**	LG Semences	2020 - Italie	**TPS**	**PS**	**PS**	RM9# (DF)	Moyenne	Moyenne	Haute	MP
Variétés issues du catalogue européen												
MP	VCM	**LID 1086L SU**	Lidea	2026 – Slovaquie	-	**MS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Haute	P/MP
P	VCM	**LG 50469 SX**	LG Semences	2026 – Italie	-	**PS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Petite	Haute	MP
P	VCM	**RGT GALLILEO AR**	RAGT Semences	2026 – Italie	-	**TPS**	**AS**	RM9#	Élevée	Moyenne	Moyenne	MP
MP	VCM	**SY IRISA AR**	Syngenta	2024 - Italie	-	**TPS**	**AS**	RM9#	Moyenne	Moyenne	Moyenne	P

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
MS/PS	Moyen à peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible
*	Donnée à confirmer


T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
P	Précoce
MP	Mi-Pardive
	Tribénuron-méthyl
	Technologie AIR

Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)

Variétés classées par indice de rendement décroissant.
Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variété Française ou européenne ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription											
LG 50479 SX (T)	MP	103.1	4.7	6/7	99.2	43.2	28.8	6.8	32.7	120	27-juin
Variétés issues du catalogue européen											
LID 1086L SU (VCM)	MP	101.0	6.0	4/7	103.7	46.2	31.9	6.6	34.5	117	28-juin
LG 50469 SX (VCM)	P	100.4	4.7	4/7	98.8	44.7	31.0	6.6	36.3	118	29-juin
SY IRISA AR (VCM)	P	99.1	5.2	3/6	100.8	44.3	32.4	8.6	33.5	114	27-juin
RGT GALLILEO AR (VCM)	MP	96.2	9.9	3/7	97.6	45.6	33.7	7.2	34.7	101	29-juin
Effectif		**7**			**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**8**	**8**
Moyenne		**23.4 q/ha**			**1.1 t/ha**	**44.9 %**	**31.5 %**	**7.2 %**	**34.3 g**	**114 cm**	**28-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire


Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Précoce linoléique VrTH"
7 essais,
Rendement moyen de la série : 23,4 q/ha
Terres Inovia
Variété (Statut) Préco maturité
Indice de rendement (% de la moyenne des essais)
Variété Française ou européenne ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription
Variétés Européennes première année d'évaluation
LG 50479 SX (T) MP
LID 1086L SU (UE) MP
LG 50469 SX (UE) P
SY IRISA AR (UE) MP
RGT GALLILEO AR (UE) P
80
85
90
95
100
105
110
115
Indice moyen 2026
CHAMBON (17)
LAZENAY (18)
LEVET (18)
LA CHAMPENOISE (36)
VILLEROMAIN (41)
OUTARVILLE (45)
MESSEME (86)

Série Précoce linoléique VrTH

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	CHAMBON - 17290	LAZENAY - 18120	LEVET - 18340	LA CHAMPENOISE - 36100	VILLEROMAIN - 41100	OUTARVILLE - 45480	MESSEME - 86200	Indice moyen
Organisme partenaire	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**FDGEDA 18**	**CA 36**	**AGRO CENTRE**	**MAS SEEDS**	**SYNGENTA**	
Code essai	17016	18010	18012	36013	41014	45015	86095	
Variété Française ou européenne ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription								
LG 50479SX	100.5	107.8	104.5	100.5	100.4	97.6	110.6	103.1
Variétés issues du catalogue européen								
LG 50469SX	103.9	97.5	92.3	106.1	101.6	98.1	103.3	100.4
LID 1086L SU	109.1	108.0	94.2	102.3	100.9	94.8	97.6	101.0
RGT GALLILEO AR	83.1	85.1	108.9	100.9	98.0	105.7	91.8	96.2
SY IRISA AR	103.4	101.6	-	90.2	99.1	103.8	96.6	99.1
Moyenne (q/ha)	**16.0**	**19.0**	**26.5**	**16.1**	**37.5**	**31.5**	**16.5**	
Informations Itinéraire Technique								
Date de semis	03 avr.	23 avr.	07 avr.	13 avr.	16 avr.	14 avr.	09 mai	
Date de récolte	06 août	11 sept.	15 août	19 août	09 sept.	01 sept.	14 sept.	
Précédent	Blé tendre d'hiver	Orge d'hiver	Orge de printemps	Orge d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé dur	Blé dur	
Texture	Argilo-limoneux	-	Limon-sableux	argilo-calcaire	Limon argileux	Limon argileux	Limono-argileux	
Dose d'azote (U/ha)	50	-	-	0	-	0	50	
Irrigation	non	non	non	non	-	non	non	

(-) données manquantes

Réseau MI-PRECOCE / MI-TARDIF Linoléique


4 variétés ont été évaluées dans le réseau Partenaires - Terres Inovia :

Regroupement national			
	Nombre d'essais mis en place	**Nombre d'essais non retenus**	**Nombre d'essais validés**
Nombre d'essais	13	5	8
Localisation : département (nb d'essais)	16, 17, 31(x2), 32(x2), 36, 37, 47(x2), 81, 82, 86	31, 32, 36, 82, 86	16, 17, 31, 32, 37, 47(x2), 81

Contacts régionaux :

- **Elodie Tourton –** Poitou-Charentes/Vendée/Limousin (e.tourton@terresinovia.fr)
- **Julien Charbonnaud** – Centre-Val de Loire (j.charbonnaud@terresinovia.fr)
- **Quentin Lambert** – Ouest Occitanie (q.lambert@terresinovia.fr)
- **Quentin Level** – Sud Nouvelle Aquitaine, Gers, Hautes-Pyrénées (q.level@terresinovia.fr)

Répartition géographique des essais variétés tournesol 2026
Réseau Mi-précoce / mi-tardif Linoléique



Liste des essais

Code essai	Lieu d'essai	Réalisateur	Commentaire	Statut
16018	**COURCOME (16)**	NEOLIS	Valide sans restriction	V
17020	**MONTROY (17)**	SYNGENTA	Valide sans restriction	V
31026	**MAUVAISIN (31)**	TERRES INOVIA	Valide sans le bloc ligne 3	V
31028	**LEVIGNAC (31)**	PIONEER SEMENCES	Trop hétérogène en stat	I
82029	**VERDUN SUR GARONNE (82)**	LIDEA	Orage après semis, croute de battance trop importante	I
32023	**CONDOM (32)**	TERRES INOVIA	Trop hétérogène	I
32025	**PAUILHAC (32)**	SYNGENTA	Valide sans restriction	V
36101	**ST FLORENTIN (36)**	MAS SEEDS	Essai trop hétérogène	I
37017	**LERNE (37)**	TERRENA	Valide sans les parcelles 101 et 102	V
47022	**ASTAFFORT (47)**	TERRES INOVIA	Valide sans la parcelle 307	V
47024	**DURAS (47)**	TERRES INOVIA	Valide sans les parcelles 102, 202 et 307	V
81027	**GAILLAC (81)**	RAGT SEMENCES	Valide sans restriction	V
86021	**LA ROCHE RIGAULT (86)**	LG SEMENCES		I
			TOTAL validés	**8**

Caractéristiques des variétés MI-PRECOCE / MI-TARDIVE linoléique

Variétés classées par ordre alphabétique.

Précocité maturité	Statut	Variété	Représentant	Année et pays d'inscription	Sensibilité phomopsis	Sensibilité verticillium	Sensibilité sclérotinia capitule	Mildiou	Richesse en huile	Taille de la graine	Hauteur	Précocité floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription												
MT	T	**MAS 98K**	Mas Seeds	2019	**PS**	**PS**	**PS**	RM9	Moyenne	Grosse	Haute	MP
MP	T	**P64LE185**	Pioneer Semences	2023 - Italie	**PS***	**TPS**	**AS**	RM9 (DF)	Elevée	Moyenne	Haute	MP
MP	1A	**P64LL187**	Pioneer Semences	2023	**TPS***	**TPS**	**AS/PS***	RM9	Elevée	Moyenne	Moyenne	MP
Variété issue du catalogue européen												
MP	VCM	**LG 50610**	LG Semences	2026 - Slovaquie	-	**PS**	**AS/PS**	RM9#	Élevée	Moyenne	Haute	MP

TPS	Très Peu Sensible
PS	Peu Sensible
AS/PS	Assez sensible/ Peu Sensible
MS	Moyennement Sensible
AS	Assez Sensible
S	Sensible

T	Témoin
(n)A	n^{ième} année de post-inscription VCE
VCM	Variété européenne en probatoire
MP	Mi-Précoce
MT	Mi-Tardive
*	Donnée à confirmer
	Tribénuron-méthyl


Profil Mildiou
(DF) = données firme
RM9 = résistante aux 9 races reconnues
RM8 = RM9 moins la race 334 (sensible ou non testée)
RM8# ou RM9# = résistante aux 8 ou 9 races reconnues + un isolat de la race 714 contournant le gène Pl8
autre : profil de race disponible sur www.myVar.fr
- : profil de race non disponible (var. européenne)

Variétés classées par indice de rendement décroissant.

Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Variété	Précocité à maturité	Indice de rendement (%)	Ecart-type	Nbre d'essais >100	Indice de rendement huile (%)	Teneur en huile aux normes (%)	Teneur en protéines (% de la MS déshuilée)	Teneur en eau à la récolte[1] (%)	PMG (g) 0 %	Hauteur (cm)	Date de floraison
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription											
MAS 98K (T)	MP	**101.2**	4.8	4/8	97.1	43.2	31.4	7.0	43.4	141	28-juin
P64LE185 (T)	MT	**100.7**	4.4	4/8	102.3	45.6	31.7	6.1	41.5	137	26-juin
P64LL187 (1A)	MP	**96.5**	3.7	1/8	97.0	45.5	33.7	6.1	46.6	119	25-juin
Variété issue du catalogue européen											
LG 50610 (VCM)	MT	**101.6**	5.5	6/8	103.6	45.9	35.1	7.2	42.0	135	25-juin
Effectif		8			**7**	**7**	**5**	**8**	**6**	**10**	**9**
Moyenne		**26.0 q/ha**			**1.2 t/ha**	**45.1 %**	**33.0 %**	**6.6 %**	**43.4 g**	**133 cm**	**26-juin**

1 : Humidité réalisée par les partenaires ou Terres Inovia au moment de la récolte, moyenne des essais utilisés pour le rendement
T : Témoin ; (n)A : n^{ième} année de post-inscription ; VCM : Variété européenne en probatoire


Productivité des variétés de Tournesol - Regroupement "Mi-Précoce linoléique"
8 essais,
Rendement moyen de la série : 26,0 q/ha
Terres Inovia
Variété (Statut) Préco maturité
Indice de rendement (% de la moyenne des essais)
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription
MAS 98K (T) MT
P64LE185 (T) MP
P64LL187 (1A) MP
Variété Européenne première année d'évaluation
LG 50610 (UE) MP
85
90
95
100
105
110
Indice moyen 2026
COURCOME (16)
SEMOUSSAC (17)
MONTROY (17)
ST PAUL LES ROMANS (26)
MAUVAISIN (31)
FLEURANCE (32)
LERNE (37)
ASTAFFORT (47)

Série Mi-précoce/ Mi-tardive linoléique

Les indices de rendement graines sont calculés en pourcentage de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais.

Lieu d'essai	COURCOME - 16240	MONTROY - 17220	MAUVAISIN - 31190	FLEURANCE - 32500	LERNE - 37500	ASTAFFORT - 47220	DURAS - 47120	SENOUILLAC - 81600	Indice moyen
Organisme partenaire	NEOLIS	SYNGENTA	TERRES INOVIA	SYNGENTA	TERRENA	TERRES INOVIA	TERRES INOVIA	RAGT SEMENCES	
Code essai	16018	17020	31026	32025	37017	47022	47024	81027	
Variétés Françaises ou européennes ayant plusieurs années d'évaluation en post-inscription									
MAS 98K	104.7	98.7	108.8	94.4	97.7	98.4	105.8	101.4	101.2
P64LE185	101.2	104.6	106.5	93.8	104.7	99.8	97.8	97.2	100.7
P64LL187	95.9	90.8	94.0	103.4	97.5	96.0	95.2	99.3	96.5
Variété issue du catalogue européen									
LG 50610	98.1	105.9	90.8	108.4	100.1	105.9	101.2	102.1	101.6
Moyenne (q/ha)	**35.3**	**21.8**	**17.9**	**18.4**	**28.1**	**34.2**	**34.3**	**18.1**	
Informations Itinéraire Technique									
Date de semis	08 avr.	10 avr.	21 avr.	21 avr.	12 mai	21 avr.	16 avr.	09 avr.	
Date de récolte	08 sept.	20 août	10 sept.	20 août	04 sept.	04 sept.	02 sept.	11-août	
Précédent	Blé tendre d'hiver	Blé dur	-	Blé dur	-	Blé tendre d'hiver	Soja	Blé tendre d'hiver	
Texture	Limono-argileux	Argilo-limoneux	-	Argile	Limono-argileux	Argile limono-sableuse	Argilo-limoneux	Argileux	
Dose d'azote (U/ha)	-	50	50	65	60	60	80	-	
Irrigation	150	non	non	non	non	80	40	non	

(-) données manquantes